



VARICELA

¿Qué es?

Enfermedad benigna propia de la infancia que se caracteriza por un exantema generalizado con estadios evolutivos



¿Quién la provoca?

VIRUS

HERPES ZOSTER

INCUBACION 14-16 días

Con predominio en edad preescolar y escolar.



¿Cómo se contagia?

Se contagia de 1-3 días antes de que aparezcan las lesiones en la piel



Al toser o estornudar.



Tocar las ampollas de la persona infectada.



Rozar objetos que el enfermo haya tocado recientemente.

Deja de ser contagioso 5 días después de la aparición del primer brote de vesículas o cuando se convierten en costras

¿COMO LO PUEDE SOSPECHAR?

ESTA ENFERMEDAD CONSTA DE 3 FASES:



Fase 1

Fiebre leve, cansancio y dolor de cabeza



Fase 2


Sarpullido rojizo

Pequeñas ronchas rojizas que pican y ampollas



Fase 3

Tarda entre 7 y 14 días en desaparecer



GRANITOS ROJOS

AMPOLLAS

COSTRAS

COMEZÓN

Que hago si mi hijo se contagió

- Acude al ISSSTE o con su medico pediatra y siga sus indicaciones
- Mantén a tu hijo en casa hasta que las costras sequen
- No permitas que tu pequeño se rasque para evitar que el virus se disperse o le queden cicatrices en la piel



RECUERDA!!!

LA VACUNACION CONTRA VARICELA ES FUNDAMENTAL PARA COMBATIR LAS MOLESTIAS OCASIONADAS POR ESTE VIRUS LA DOSIS DE PROTECCION SE APLICA A LOS 15 MESES Y A LOS 4 AÑOS DE EDAD