



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
DIRECCIÓN DE LOS CENDI Y JARDÍN DE NIÑOS



ENFERMEDADES INFECCIOSAS IMPORTADAS



ESTIMADAS MADRES USUARIAS:


La Dirección General de Personal y la Dirección de los CENDI y Jardín de Niños UNAM a través de la Coordinación Médica pone a su disposición información para conocer algunas de las enfermedades que pueden confundirse con COVID-19 ya que tienen a la fiebre como síntoma cardinal, así como otros síntomas que puedan hacerle sospechar de su presencia tras un viaje internacional a regiones endémicas en donde existe una alta incidencia de casos.

¿QUÉ ES UNA INFECCIÓN IMPORTADA?



SON INFECCIONES ADQUIRIDAS EN UN PAÍS DONDE SON FRECUENTES Y QUE SE MANIFIESTAN CLÍNICAMENTE EN OTRO PAÍS EN EL QUE SON MUY INFRECUENTES O NO EXISTEN. NO NECESARIAMENTE SE ADQUIEREN VIAJANDO AL LUGAR SINO QUE ALGUIEN PUEDE SER PORTADOR Y CONTAGIAR. TE PRESENTAMOS LAS MÁS FRECUENTES:

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SU INCIDENCIA HA INCREMENTADO DEBIDO AL NÚMERO DE PERSONAS QUE SE DESPLAZAN A OTROS PAÍSES CON FINES TURÍSTICOS, FAMILIARES, LABORALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES.



ES POR ELLO IMPORTANTE QUE AL DETECTAR LA PRESENCIA DE FIEBRE COMO UN SÍNTOMA INICIAL DESPUÉS DE UN VIAJE INTERNACIONAL SE TENGAN EN CUENTA ALGUNAS ENFERMEDADES PROPIAS DE LA REGIÓN A LA QUE SE REALIZÓ EL VIAJE. ALGUNAS DE ELLAS LAS MENCIONAREMOS A CONTINUACIÓN:



FIEBRE TIFOIDEA

LA FIEBRE TIFOIDEA ES UNA INFECCIÓN GENERADA POR LA BACTERIA:

Salmonella Typhi



AL INGERIR AGUA O ALIMENTOS CONTAMINADOS POR UNA PERSONA INFECTADA YA SEA MEDIANTE SUS HECES FECALES O EL CONTACTO CON LAS MANOS SUCIAS.



ES UNA ENFERMEDAD ENDÉMICA (EXCLUSIVA DE CIERTAS REGIONES) ENTRE ELLAS: SURESTE DE ASIA, ÁFRICA, AMÉRICA CENTRAL Y SUDAMÉRICA



AFECTA
PREDOMINANTEMENTE
A LOS NIÑOS ENTRE

5-19



AÑOS DE EDAD

¿CUÁNDO DEBO SOSPECHAR DE FIEBRE TIFOIDEA?
AL HABER VIAJADO
RECIENTEMENTE A
REGIONES ENDÉMICAS

Y

PRESENTAR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES
SÍNTOMAS:

- FIEBRE
- SUDORACIÓN
- DOLOR DE CABEZA
- DOLOR ABDOMINAL
- DEBILIDAD Y CANSANCIO
- ESTREÑIMIENTO O DIARREA
- FALTA DE APETITO
- SARPULLIDO TEMPORAL CON PEQUEÑAS ELEVACIONES ROSADAS SOBRE EL ABDOMEN O PECHO





SI SU HIJO PRESENTA ESTOS SÍNTOMAS ES
IMPORTANTE NO AUTOMEDICARSE Y ACUDIR A
SU CLÍNICA DEL ISSSTE PARA VALORACIÓN Y
TRATAMIENTO OPORTUNO.



¿CÓMO PREVENIR LA FIEBRE TIFOIDEA?

- DESINFECTAR EL AGUA QUE SE UTILIZA PARA BEBER Y PREPARAR ALIMENTOS
- DESINFECTAR FRUTAS Y VERDURAS
- LAVADO FRECUENTE DE MANOS
- BEBER ÚNICAMENTE AGUA POTABLE O DESINFECTADA
- INGERIR ALIMENTOS BIEN COCIDOS
- EVITAR LA INGESTA DE ALIMENTOS QUE SE ADQUIERAN EN LA VÍA PÚBLICA





FIEBRE DEL NILO



LA FIEBRE DEL NILO ES UNA INFECCIÓN GENERADA POR EL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL QUE PERTENECE A UN GRUPO DE VIRUS CONOCIDOS COMO FLAVIVIRUS QUE SON TRANSMITIDOS POR LA PICADURA DE UN MOSQUITO.

ESTOS MOSQUITOS CONTRAEN EL VIRUS AL PICAR A AVES INFECTADAS Y DESPUÉS TRANSMITEN EL VIRUS A LOS SERES HUMANOS.



ES UNA ENFERMEDAD ENDÉMICA (EXCLUSIVA DE CIERTAS REGIONES) ENTRE ELLAS: ÁFRICA, ASIA OCCIDENTAL, AUSTRALIA, EUROPA Y MEDIO ORIENTE.




ES MÁS FRECUENTE ENTRE FINALES DEL VERANO Y COMIENZOS DEL OTOÑO

(EL MAYOR NÚMERO DE INFECCIONES SE REPORTAN EN LOS MESES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE)

¿CUÁNDO DEBO SOSPECHAR DE FIEBRE DEL NILO?
AL HABER VIAJADO RECIENTEMENTE A REGIONES ENDÉMICAS

- FIEBRE
- DOLOR DE CABEZA
- DOLOR MUSCULAR
- VÓMITO
- DIARREA
- FATIGA
- SARPULLIDO EN LA PIEL



Y PRESENTAR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS:



EN MENOS DEL 1% DE LAS PERSONAS INFECTADAS PUEDE PRODUCIR UNA INFECCIÓN GRAVE EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN LA QUE ADEMÁS DE LOS ANTERIORES SE PRESENTA:

- RIGIDEZ DE CUELLO
- DESORIENTACIÓN Y CONFUSIÓN
- CONVULSIONES
- PERDIDA DE VISIÓN
- ENTUMECIMIENTO



SI SU HIJO PRESENTA ESTOS SÍNTOMAS ES IMPORTANTE NO AUTOMEDICARSE Y ACUDIR A SU CLÍNICA DEL ISSSTE PARA VALORACIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO.



¿CÓMO PREVENIR LA FIEBRE DEL NILO?

EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE NINGUNA VACUNA PARA PODER PREVENIRLA PERO SE PUEDEN LLEVAR A CABO MEDIDAS PARA EVITAR LA PICADURA DE MOSQUITOS:

UTILIZAR PLAYERAS DE MANGA LARGA Y PANTALONES LARGOS



APLICAR REPELENTE DE INSECTOS EN LAS ZONAS EXPUESTAS CUANDO SE ESTE AL AIRE LIBRE

COLOCAR MOSQUITEROS EN LA ZONA DONDE VA A DORMIR




ELIMINAR FUENTES DE AGUA ESTANCADA PARA LIMITAR SU REPRODUCCIÓN



FIEBRES HEMORRAGICAS VIRALES

ENTRE ELLAS SE ENCUENTRA:

FIEBRE AMARILLA



SON UN GRUPO DE ENFERMEDADES VIRALES DE ETIOLOGÍA DIVERSA QUE TIENEN COMO CARACTERÍSTICA LA PRESENCIA DE FIEBRE Y HEMORRAGIAS.

FIEBRE DE LASSA



ÉBOLA




EBOLA

FIEBRE AMARILLA

TIPO DE VIRUS

FLAVIVIRIDAE



TRANSMISIÓN

SE TRANSMITE A TRAVÉS DE LA PICADURA DE UN MOSQUITO DE LA FAMILIA AEDES




ZONAS ENDÉMICAS
ÁFRICA, AMÉRICA CENTRAL,
SUDAMÉRICA



SÍNTOMAS


- FIEBRE
- DOLOR MUSCULAR
- DOLOR DE CABEZA
- NÁUSEAS Y VÓMITO

- PERDIDA DEL APETITO
- **COLOR AMARILLENTO EN PIEL Y OJOS**
- DOLOR ABDOMINAL
- ORINA OSCURA
- SANGRADO OCULAR, NASAL, BUCAL O GASTROINTESTINAL



APLICACIÓN DE VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA 10 DÍAS ANTES DE VIAJAR A UNA ZONA ENDÉMICA

ESTRATEGIAS PARA EVITAR LA PICADURA DE MOSQUITOS ANTES MENCIONADAS



MEDIDAS DE PREVENCIÓN



FIEBRE DE LASSA

TIPO DE VIRUS

ARENNAVIRUS



TRANSMISIÓN

SE TRANSMITE POR CONTACTO
CON ALIMENTOS O UTENSILIOS
CONTAMINADOS CON ORINA Y
HECES DE ROEDORES



ZONAS ENDÉMICAS



ÁFRICA OCCIDENTAL (BENIN, GHANA,
GUINEA, LIBERIA, MALI, SIERRA LEONA
Y NIGERIA)



SÍNTOMAS

- FIEBRE
- DOLOR MUSCULAR
- DIARREA
- NÁUSEAS Y VÓMITO

- DOLOR DE GARGANTA, TOS SECA, DOLOR TORÁCICO
- EDEMA FACIAL
- SANGRADO NASAL, BUCAL O GASTROINTESTINAL



EVITAR
DESPLAZAMIENTOS
A ZONAS
AFECTADAS



MEDIDAS
DE
PREVENCIÓN



ÉBOLA

TIPO DE
VIRUS

ÉBOLAVIRUS

EBOLA



TRANSMISIÓN

SE TRANSMITE A TRAVÉS DEL CONTACTO DIRECTO
CON EL CUERPO, FLUIDOS CORPORALES, ROPA
CONTAMINADA O SABANAS DE UNA PERSONA
INFECTADA.

LOS MURCIÉLAGOS Y MONOS SON SUS PORTADORES Y
AL SER CAZADOS PARA SU CONSUMO TRANSMITEN EL
VIRUS AL SER HUMANO



ZONAS ENDÉMICAS
ÁFRICA
OCCIDENTAL



LAVADO DE MANOS FRECUENTE

Evitar desplazamientos a zonas afectadas

SÍNTOMAS

- Fiebre
- Escalofríos
- Dolor muscular
- Dolor de cabeza
- Dolor abdominal

SÍNTOMAS SECUNDARIOS


- Dolor de garganta, tos seca
- Sarpullido de color purpura en la piel
- Sangre en heces
- Sangre en orina

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Evitar contacto con animales salvajes y consumo de carne cruda



SI SU HIJO PRESENTA ESTOS SÍNTOMAS ES
IMPORTANTE NO AUTOMEDICARSE Y ACUDIR A
SU CLÍNICA DEL ISSSTE PARA VALORACIÓN Y
TRATAMIENTO OPORTUNO.



PORQUE LA UNAM NO SE DETIENE

BIBLIOGRAFÍA:

- LÓPEZ R. MARTÍN E. GUÍA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS IMPORTADAS. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. GOBIERNO DE ESPAÑA.
- MARCIPE R. CANADELL D. PATOLOGÍA IMPORTADA POR EL NIÑO VIAJERO. 2015; 8(4):164-174.
- REDONDO A. ENFERMEDADES INFECCIOSAS IMPORTADAS. MANUAL DE ATENCIÓN AL PACIENTE INMIGRANTE.
- STEPHENS I, LEVINE MM. TRATAMIENTO DE LA FIEBRE TIFOIDEA EN NIÑOS. REV. SOCIEDAD BOLIVIANA DE PEDIATRÍA, V.41, N.2.
- VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL. STANFORD CHILDREN'S HEALTH. LUCILE PACKARD CHILDREN'S HOSPITAL.
- FIEBRES HEMORRÁGICAS VIRALES. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. OMS.
- ABARCA K. DABANCH J. FIEBRE AMARILLA. COMITÉ DE INFECCIONES EMERGENTES. REV. CHIL INFECT (2001); 18 (1):64-68.
- GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA. GPC DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA LA FIEBRE TIFOIDEA.